مركز بحوث الأحياء البحرية
ص. ب. 30830 تاجوراء

دليل مصور
لبعض الأسماك الإقتصادية بالمياه الليبية

إعداد
شعبة الأسماك

تم الإعداد الفني والطباعة بدار ادفرا – باريس

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية 1990م

مـقـدمـة

سعياً من مركز بحوث الأحياء البحرية إلى إيجاد تعريفات علمية صحيحة لكل نوع من أنواع الأسماك وكافة الأحياء البحرية وصياغتها فى دليل عملى يكون أداةً للتعريف السريع على تلك الأسماك و غيرها من الكائنات البحرية بحيث يسهل استعماله من قبل المهتمين بقطاع الثروة السمكية سواء من حيث الدراسة والبحث ، أو من حيث التخطيط و الإدارة ، أو على الصعيد التنفيذى فى مجال صيد الأسماك (هواية أو احترافا) وتسويقها وتصنيعها ، أو مجرد الصيد والاستهلاك المباشر . من أجل ذلك وإلى هؤلاء جميعا نقدم هذا الدليل المصور الذى يتيح بساطة التعرف على بعض الأسماك ذات الأهمية الاقتصادية فى مياه الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى من البحر المتوسط .

يحتوى الدليل على رسومات مصورة لتسعة وتسعين نوعاً من الأسماك العظمية و الغضروفية تنتمى إلى أربعين عائلة . وقد خصص لكل نوع من هذه الأنواع ورقة منفردة و ذلك بغية تيسير الاستعمال اليومى لهذا الدليل . وقد ضمنا الإسم العلمى (اللاتينى) والإسم العربى أو الإسم المحلى لكل نوع ، مع نبذة مختصرة عن البيئة التى يقطنها والغذاء الذى يعيش عليه ، ومدى حجمه الممكن ، ومواسم تكاثره ثم الطرق المتبعة فى صيده .

واستعنا فى إعداد هذا الدليل بأحدث الكتب والتقارير الصادرة عن كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو : 1986 و 1987) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو : 1988) إلى جانب عدد من التقارير الأخرى . و نأمل أن يحقق هذا الدليل الغرض الذى أعدّ من أجله كما نأمل أن يكون فى هذا العمل مساهمةً فى إثراء المكتبة العربية بالكتب المتخصصة فى مجالات علوم الحياة البحرية .

والله ولى التوفيق .

ناصر خليفة الكبير
شعبة الأسماك

تقديم

مساهمةً من مركز بحوث الأحياء البحرية فى التوعية العلمية للجماهير العريضة المدعوة إلى ارتياد البحر و سواحله و مزاولة صيد الأسماك سواء لأغراض الهواية أو الاحتراف ، وإدراكاً منه لأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه كل مواطن تجاه الاستثمار الأمثل لهذه الموارد الحية المتجددة من خلال اتباع الطرق و الأدوات التى تتناسب مع صيد كل نوع منها ، و تحاشى صيدها فى مواسم ومواطن تكاثرها ، إلى جانب المحافظة على بيئتها البحرية من مخاطر التلوث و عواقبه ، فى سبيل ذلك كان قد صدر عن المركز « دليل للتعرف على الأسماك الغضروفية فى البحر المتوسط » وهو يقدم اليوم هذا الدليل المصور لبعض أنواع الأسماك التى تزخر بها مياه السواحل البحرية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .

إن هذا الدليل يمد القارئ الكريم بمعلومات هامة مبسطة حول هوية و بيولوجية هذه الأنواع السمكية و طرق صيدها . و نود الإشارة إلى أن المركز يعكف على إصدار ملاحق لهذا الدليل سعياً منه إلى تكملة جرد كافة أنواع الأسماك و الرخويات و القشريات و غيرها من الأحياء البحرية الأخرى بمياه الجماهيرية العظمى تحقيقاً لأحد الأغراض الواردة فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1582) لسنة 81 م القاضى بإنشاء مركز بحوث الأحياء البحرية .

و الله ولى التوفيق .


د. عتيق العربي الهونى
أمين عام مركز بحوث الأحياء البحرية

المحتويات

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية، تاجوراء، 1990 م

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونِّيدي



الإسم المحلّي : تونة زرقاء الزعنفة

الإسم العلمي : ثنّاس ثنّاس

Thunnus thynnus

الإسم الإنجليزي : بلوفين تونا

Bluefin tuna

تونة زرقاء الزعنفة

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الباردة ، ومهاجرة إلى المياه الدافئة القريبة من السواحل .

الغذاء : القشريات ، الرخويات ، وأسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : شهرا الصيف (يونيو) و ناصر (يوليو)

الحجم : 50 - 300 سم

طرق الصيد : التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونِّيدي



الإسم المحلّي : تونة صفراء الزعنفة

الإسم العلمي : ثناس ألباكارس

Thunnus albacares

الإسم الإنجليزي : يلوفين تونا

Yellowfin tuna

تونة صفراء الزعنفة

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

الغذاء : القشريات ، الرخويات ، وأسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) – الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 50 – 200 سم .

طرق الصيد : التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونِّيدي



الإسم المحلّي : تونة طويلة الزعنفة (ألْبَكور)

الإسم العلمي : ثناس ألالونقا

Thunnus alalunga

الإسم الإنجليزي : ألْبَكور

Albacore

تونة طويلة الزعنفة (ألْبَكور)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، مهاجرة تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة والباردة .

الغذاء : القشريات ، الرخويات ، وأسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 50 – 100 سم .

طرق الصيد : التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونِّيدي



الإسم المحلّي : التونة الوثّابة (سكيب جاك)

الإسم العلمي : كاتسيوونس بيلاميس

Katsuwonus pelamis

الإسم الإنجليزي : سكيب جاك تونا

Skipjack tuna

التونة الوثّابة (سكيب جاك)

المعيشة : عائمة ومهاجرة تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة .

الغذاء : أسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : **أ**شهر الطّير (إبريل) – الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 30 – 100 سم .

طرق الصيد : الخيط الطويل (برنقالي) وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونِّيدي



الإسم المحلّي : التونة الصغيرة (رزام منقط)

الإسم العلمي : إيوثِنّاس ألّتِراتَسْ

Euthynnus alletteratus

الإسم الإنجليزي : ليتل تاني

Little tunny

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

التونة الصغيرة (رزام منقّط)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

الغذاء : أسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : أشهر الطير (إبريل) - الحرث (نوفمبر) .

الحجم : 30 - 100 سم .

طرق الصيد : الخيط الطويل (برنقالي) ، الشباك الخيشوميّة ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : THUNNIDAE

عائلة : ثونّيدي



الإسم المحلّي : التونة الفرقاطة (رزام عادي)

الإسم العلمي : أيوكيسيز روكي

Auxis rochei

الإسم الإنجليزي : بوليت تونا

Bullet tuna

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

التونة الفرقاطة (رزام عادي)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل والجزر .


الغذاء : أسماك السردين والأنشوقة .

موسم التكاثر : أشهر هانيبال (أغسطس) – الحرث (نوفمبر) .

الحجم : 20 – 50 سم .

طرق الصيد : الخيط الطويل (برنقالي) ، الشباك الخيشوميّة ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : SCOMBERMORIDAE **عائلة** : سكومبرموريدي



الإسم المحلّي : البلاميط (بونيتو)

الإسم العلمي : أورسينوبسيس يونيكولور

Orcynopsis unicolor

الإسم الإنجليزي : بلَيْن بونيتو

Plain bonito

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

البلاميط (بونيتو)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، ومهاجرة تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

الغذاء : أسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : أشهر ناصر (يوليو) – الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 25 - 110 سم .

طرق الصيد : التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : SCOMBERMORIDAE

عائلة : سكومبرموريدي



الإسم المحلّي : البلاميط المخطط (بونيتو)

الإسم العلمي : ساردا ساردا

Sarda sarda

الإسم الإنجليزي : أطلانطيك بونيتو

Atlantic bonito

البلاميط المخطط (بونيتو)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة القريبة من السواحل .

الغذاء : أسماك السردين ، الحصان (الكواللِّي) والأنشوقة .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) – ناصر (يوليو) .

الحجم : 25 – 90 سم .

طرق الصيد : التُّنَّارة ، الخيط الطويل (برنقالي) ، وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : XIPHIIDAE

عائلة : زيفيدى



الإسم المحلّي : أبوسيف

الإسم العلمي : زيفياس قلادياس

Xiphias gladius

الإسم الإنجليزي : سوردفيش

Swordfish

أبو سيف

المعيشة : أسماك قاعية مهاجرة ، تعيش عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : الأسماك (سردين ، كواللي) والرخويات (سيبيا ، أخطبوط) .


موسم التكاثر : أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 25 – 35 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والخيط الطويل (برنقالي) .

FAMILY : SCOMBRIDAE

عائلة : سكومبريدي



الإسم المحلّي : الحصان (كوالّي)

الإسم العلمي : سكومبرجابونيكوس

Scomber japonicus

الإسم الإنجليزي : تشوب ماكريل

Chub mackerel

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

الحصان (كواللّي)

المعيشة : أسماك عائمة بالمياه العليا ، وتعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 250 و 300 متر.

الغذاء : القشريات وأسماك السردين والأنشوقة .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 15 - 50 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : SCOMBRIDAE

عائلة : سكومبريدي



الإسم المحلّي : الحصان (كواللّي)

الإسم العلمي : سكومبر سكومبرس

Scomber scombrus

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك ماكريل

Atlantic mackerel

الحصان (كواللّي)

المعيشة : عائمة بالمياه العليا وتعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 200 و250 متراً .

الغذاء : القشريات وأسماك السردين وثعبان البحر .

موسم التكاثر : فصلا الربيع وأوائل فصل الصيف .

الحجم : 30 – 50 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CORYPHAENIDAE

عائلة : كوريوفينيدي



الإسم المحلّي : سمكة الدلفين (المبوكة)

الإسم العلمي : كوريوفينا هيبيوراس

Coryphaena hippurus

الإسم الإنجليزي : كومون دلفين فيش

Common dolphin-fish

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

سمكة الدلفين (المبوكة)

المعيشة : عائمة بالمياه المفتوحة ، وتعيش في مجموعات بالقرب من السواحل .

الغذاء : القشريات ، الرخويات وأسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : فصلا الصيف والخريف .

الحجم : 100 - 200 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الخيط الطويل (برنقالي) ، والشباك الخيشومية .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلّي : السّردينة

الإسم العلمي : سبراتس سبراتس

Sprattus sprattus

الإسم الإنجليزي : سبرات

Sprat

السردينة

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : القشريات ، الهوائم (العوالق) النباتية ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الحرث (نوفمبر) – الطير (إبريل) .

الحجم : 8 - 16 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلّي : السردينة

الإسم العلمي : سردينيلاّ بلكاردس

Sardinella pilchardus

الإسم الإنجليزي : يوربيّان بلكارد

European pilchard

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

السردينة

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 15 و 55 مترًا .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الحرث (نوفمبر) – الصيف (يونيو) .

الحجم : 15 – 25 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلّي : السردينة

الإسم العلمي : سردينلاّ أوريتا

Sardinella aurita

الإسم الإنجليزي : راوند سردينلاّ

Round sardinella

السردينة

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تصل إلى 350 مترًا .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصلا الربيع و الصيف .

الحجم : 20 – 30 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : CLUPEIDAE

عائلة : كلوبيدي



الإسم المحلّي : اللُّوزة

الإسم العلمي : سردينلاّ مادرينسس

Sardinella maderensis

الإسم الإنجليزي : ماديران سردينلاّ

Madeiran sardinella

اللُّوزة

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات عند أعماق تصل إلى 50 مترًا .

الغذاء : اللافقاريات ، يرقات الأسماك و الهوائم النباتية .

موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 – 30 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : ENGRAULIDAE

عائلة : إنقروليدي



الإسم المحلّي : الأنشوقة

الإسم العلمي : أنقروليس إنكراسيكولس

Engraulis encrasicolus

الإسم الإنجليزي : يوروبيّان أنكوفي

European anchovy

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

الأنشوقة

المعيشة : عائمة ومهاجرة في مجموعات عند أعماق تصل إلى 150 مترًا .

الغذاء : الهوائم (العوالق) الحيوانية ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 12 – 20 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) .

FAMILY : BELONIDAE

عائلة : بيلونيدي



الإسم المحلّي : إبرة البحر

الإسم العلمي : بيلون بيلون

Belone belone

الإسم الإنجليزي : قارفيش

Garfish

إبرة البحر

المعيشة : قاعية تعيش بالأعماق العليا الدافئة القريبة من الشواطئ .


الغذاء : يرقات الأسماك والقشريات .

موسم التكاثر : أشهر النوّار (فبراير) – الماء (مايو) .

الحجم : 40 - 100 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية وشباك الإحاطة (التحليق) .

FAMILY : CARANGIDAE — **عائلة** : كارانجيدي



الإسم المحلّي : الصنّاوُرُو

الإسم العلمي : تراكيورس ميدترّنياس

Trachurus mediterraneus

الإسم الإنجليزي : ميدترانيان هورس ماكريل

Mediterranean horse-mackerel

منشورات مركز بحوث الاحياء البحرية تاجوراء 1990 م

الصَّاوْرُو

المعيشة : عائمة قرب القاع ، ومهاجرة تعيش في مجموعات عند أعماق تتراوح بين 40 و 500 متر .

الغذاء : القشريات وأسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 10 – 50 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) وشباك الجرف .

FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلّي : الصّاوْرُو

الإسم العلمي : تراكيورس تراكيورس

Trachurus trachurus

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك هورس ماكريل

Atlantic horse-mackerel

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية - تاجوراء، 1990 .

الصَّاوْرُو

المعيشة : عائمة تعيش بالمناطق الرملية عند أعماق تتراوح بين 100 و 200 متر .

الغذاء : القشريات ، الرخويات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 – 60 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) ، شباك الجرف والخيط الطويل (برنقالي) .

FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلّي : الشُّولَة

الإسم العلمي : سيريولا دوميريلي

Seriola dumerili

الإسم الإنجليزي : قريتر أمبرجاك

Greater amberjack

الشَّولَة

المعيشة : عائمة ، تعيش بالقرب من الشواطئ والشعاب المرجانية عند أعماق تتراوح بين 18 و 72 متراً .

الغذاء : الأسماك (سردين ، أنشوقة ، كواللي) واللافقاريات .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 – 188 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : CARANGIDAE

عائلة : كارانجيدي



الإسم المحلّي : الصلفاقة (استريليا)

الإسم العلمي : ليشيا أميا

Lichia amia

الإسم الإنجليزي : ليرفيش

Leerfish

الصَّلفاقة (استريليا)

المعيشة : عائمة ، تعيش عند أعماق تصل إلى 50 مترًا .

الغذاء : أسماك السردين ، الأنشوقة والكواللي .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 - 180 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : MERLUCCIDAE

عائلة : ميرلوسيدي



الإسم المحلّي : النَّازلِّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : مرلوشياس مرلوشياس

Merluccius merluccius

الإسم الإنجليزي : هيك

Hake

النّازللّي (مارلوتسو)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 100 و 300 متر .

الغذاء : القشريات وأسماك السردين والأنشوقة .


موسم التكاثر : فصلا الشتاء والربيع .

الحجم : 15 - 90 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : النازلِّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : ترايسوبتروس مينوتاس

Trisopterus minutus

الإسم الإنجليزي : بوركود

Poor cod

النازلِّي (مارلوتسو)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 30 و 300 متر .

الغذاء : القشريات ، الديدان البحرية ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : **أشهر** النوّار (فبراير) – الطير (إبريل) .

الحجم : 15 – 26 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : ميرلانجياس ميرلانجس

Merlangius merlangus

الإسم الإنجليزي : وايتنج

Whiting

النازلِّي (مارلوتسو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 5 و 100 متر .

الغذاء : القشريات ، الديدان البحرية ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر أيّ النار (يناير) – ناصر (يوليو) .

الحجم : 15 – 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : النازلّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : ميكرومسيستيوس بوتاسّو

Micromesistius poutassou

الإسم الإنجليزي : بلو وايتنج

Blue whiting

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 .

النازلّي (مارلوتسو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 30 و 400 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 25 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : النازلِّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : تريسوبترس لوسكاس

Trisopterus luscus

الإسم الإنجليزي : بوتنج (بيب)

Pouting (bib)

النازلِّي (مارلوتسو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية عند أعماق تتراوح بين 30 و 100 متر .

الغذاء : القشريات ، الديدان البحرية ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : شهرا المرّيخ (مارس) و الطير (إبريل) .

الحجم : 15 - 45 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : النازلِّي (مارلوتسو)

الإسم العلمي : قيدروبسرس ميدترّانياس

Gaidropsarus mediterraneus

الإسم الإنجليزي : شور روكلنج

Shore rockling

النازلِّي (مارلوتسو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 27 و 100 متر .

الغذاء : يرقات الأسماك ، الديدان البحرية ، القشريات والطحالب البحرية .


موسم التكاثر : فصل الشتاء وأوائل الربيع .

الحجم : 5 - 30 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : الذِّئب (لوبُّو)

الإسم العلمي : فايسيس بلنُّويدس

Phycis blennoides

الإسم الإنجليزي : جريتر فوركبيرد

Greater fork-beard

الذِّئْب (لوبُّو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 10 و 300 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الربيع وأوائل الصيف .

الحجم : 30 - 75 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : GADIDAE

عائلة : قاديدي



الإسم المحلّي : الذِّئب (ذئب)

الإسم العلمي : فايسيس فايسيس

Phycis phycis

الإسم الإنجليزي : فورك بيرد

Fork-beard

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

الذِّئْب (ديب)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 100 و 200 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : **أشهر** أيّ النار (يناير) – الماء (مايو) .

الحجم : 15 - 65 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلّي : البوري بودماغ

الإسم العلمي : ميوجل سيفالاس

Mugil cephalus

الإسم الإنجليزي : فلاتهيد قرى موليت

Flathead grey mullet

البوري بودماغ

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ و البحيرات .

الغذاء : اللافقاريات ، الطحالب وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : أشهر ناصر (يوليو) – التّمور (أكتوبر) .

الحجم : 20 – 100 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيّر (الترامل) ، والصنارة والخيط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلّي : البوري بو شارب

الإسم العلمي : كيلون لا بروساس

Chelon labrosus

الإسم الإنجليزي : ثيكليب قرى موليت

Thicklip grey mullet

البوري بوشارب

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات ، الطحالب ، وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : فصل الشتاء . أشهر الكانون (ديسمبر) – النوار (فبراير) .

الحجم : 15 - 70 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيّر (الترامل) و الصنارة والخيط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلّي : البوري بونميلة (أوراغي)

الإسم العلمي : ليزا أوراتس

Liza auratus

الإسم الإنجليزي : قولدن قرى موليت

Golden grey mullet

البوري بونميلة (أوراغي)

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات ، وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : فصل الصيف . أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 5 – 50 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيّر (الترامل) ، والصنارة والخيط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلّي : البوري

الإسم العلمي : ليزا سالينس

Liza saliens

الإسم الإنجليزي : ليبنج موليت

Leaping mullet

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

البوزي

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : فصل الصيف ، أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 15 - 40 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيّر (الترامل) والصنارة والخيط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلّي : البوري

الإسم العلمي : ليزا رامادا

Liza ramada

الإسم الإنجليزي : ثنليب قرى موليت

Thinlip grey mullet

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

البوري

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات والأنهار .

الغذاء : اللافقاريات ، الطحالب ، وكائنات الهوائم الدقيقة .


موسم التكاثر : **أشهر** التمور (أكتوبر) - الكانون (ديسمبر) .

الحجم : 20 - 60 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، شباك المحيّر (الترامل) والصنارة والخيط .

FAMILY : MUGILIDAE

عائلة : ميوجليدي



الإسم المحلّي : البوري

الإسم العلمي : أوداليكيلس لابيو

Oedalechilus labeo

الإسم الإنجليزي : بوكسليب موليت

Boxlip mullet

البوري

المعيشة : عائمة ، تعيش بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات .

الغذاء : اللافقاريات وكائنات الهوائم الدقيقة .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 5 - 25 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية ، والخيط بالصنّار.

FAMILY : MORONIDAE

عائلة : مورونيدي



الإسم المحلّي : القاروص العادي

الإسم العلمي : ديسنتراركس لابركس

Dicentrarchus labrax

الإسم الإنجليزي : يوربيّان سيباس

European seabass

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

القاروص العادي

المعيشة : عائمة بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات والأنهار .

الغذاء : القشريات ، القواقع البحرية ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : شهرا أيّ النار (يناير) و النوّار (فبراير) .

الحجم : 20 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، و الخيط بالصنّار .

FAMILY : MORONIDAE

عائلة : مورونيدي



الإسم المحلّي : القاروص المنقط

الإسم العلمي : ديسنتراركس بنكتاتس

Dicentrarchus punctatus

الإسم الإنجليزي : سبوتد سيباس

Spotted seabass

القاروص المنـقَّـط

المعيشة : عائمة بالمياه الدافئة القريبة من الشواطئ والبحيرات والأنهار .

الغذاء : القشريات ، القواقع البحرية ، ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : شهرا أيّ النار (يناير) و النوّار (فبراير) .

الحجم : 20 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الإحاطة (التحليق) ، الشباك الخيشومية ، والخيط بالصنّار .

FAMILY : MULLIDAE

عائلة : ميولّيدي



الإسم المحلّي : السلطان إبراهيم (تريليا حجر)

الإسم العلمي : مولاّس سرميوليتس

Mullus surmuletus

الإسم الإنجليزي : ستريبد ريد موليت

Striped red mullet

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

السلطان إبراهيم (تريليا حجر)

المعيشة : قاعية تعيش بالمناطق الصخرية و الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : الأحياء القاعية الدقيقة (القشريات والقواقع البحرية) .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) – ناصر (يوليو) .

الحجم : 20 – 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : MULLIDAE

عائلة : ميولّيدي



الإسم المحلّي : السلطان إبراهيم (تريليا رمل)

الإسم العلمي : مولاس بارباتس

Mullus barbatus

الإسم الإنجليزي : ريد موليت

Red mullet

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

السلطان إبراهيم (تريليا رمل)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة والصخرية عند أعماق تتراوح بين 100 و 300 متر .

الغذاء : الأحياء القاعية الدقيقة (القشريات ، الديدان والقواقع البحرية) .


موسم التكاثر : أشهر الطير (إبريل) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 10 – 30 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : المرجان العادي (باقرو)

الإسم العلمي : باقرس باقرس

Pagrus pagrus

الإسم الإنجليزي : كومون سيبريم

Common sea bream

المرجان العادي (باقرو)

المعيشة : قاعيّة ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 250 مترًا .

الغذاء : القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : فصلا الشتاء والربيع .

الحجم : 20 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : مرجان النقط الزرقاء (باقرو)

الإسم العلمي : باقرس كورليوستيكتس

Pagrus coeruleostictus

الإسم الإنجليزي : بلوسبوتّد سيبريم

Blue-spotted sea bream

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

مرجان النقط الزرقاء (باقرو)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تتراوح بين 50 و 200 متر .

الغذاء : القشريات ، القواقع البحرية ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الربيع - فصل الخريف .

الحجم : 30 - 90 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : المرجان البرنزي (بازوكا)

الإسم العلمي : باجيلاّس أكارن

Pagellus acarne

الإسم الإنجليزي : أكزيلاّري سيبريم

Axillary sea bream

المرجان البرنزي (بازوكا)

المعيشة : قاعيّة ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 250 مترًا .

الغذاء : القشريات ، القواقع البحرية و يرقات الأسماك .


موسم التكاثر : شهر الصيف (يونيو) ، شهر الفاتح (سبتمبر) ، وفصل الخريف .

الحجم : 20 - 35 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : المرجان بوعين

الإسم العلمي : دينتكس ماكرفثالمس

Dentex macrophthalmus

الإسم الإنجليزي : لارج آيد دينتكس

Large-eyed dentex

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

المرجان بوعين

المعيشة : قاعيّة ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 250 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الشتاء ، شهرا الطير (أبريل) و الماء (مايو) .

الحجم : 15 - 30 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : المرجان الأحمر

الإسم العلمي : باجيلاّس إريثرينس

Pagellus erythrinus

الإسم الإنجليزي : كومون باندورا

Common pandora

المرجان الأحمر

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .

الغذاء : القشريات ، القواقع والديدان البحرية ، ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 15 - 55 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : العضّاض (جفّالي)

الإسم العلمي : دنتكس جيبوسس

Dentex gibosus

الإسم الإنجليزي : بينك دنتكس

Pink dentex

العضّاض (جفّالي)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تتراوح بين 20 و 220 مترًا .

الغذاء : الأسماك ، القشريات ، والرخويات (السَّيبيا و الأخطبوط) .


موسم التكاثر : فصل الربيع ؛ أشهر المريخ (مارس) – الماء (مايو) .

الحجم : 40 – 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : العَضّاض (دندشي)

الإسم العلمي : دنتكس دنتكس

Dentex dentex

الإسم الإنجليزي : كومون دنتكس

Common dentex

العضّاض (دندشي)

المعيشة : قاعية ، تعيش عند أعماق تتراوح بين 15 و 200 متر .

الغذاء : يرقات الأسماك والرخويات (السّيبيا والأخطبوط).


موسم التكاثر : شهر الماء (مايو) .

الحجم : 35 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : الدُّنيسْ (أوراتا)

الإسم العلمي : سبارس أوراتا

Sparus aurata

الإسم الإنجليزي : جيلتهيد سيبريم

Gilt-head sea bream

الدَّنيس (أوراتا)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية ، وفي البحيرات ، عند أعماق تتراوح بين 30 و 150 متراً .

الغذاء : القشريات ، القواقع والديدان البحرية .


موسم التكاثر : أشهر التمور (أكتوبر) - الكانون (ديسمبر) .

الحجم : 20 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : القَراقُوزْ المَوَشَّمْ

الإسم العلمي : دبلودس فولقارس

Diplodus vulgaris

الإسم الإنجليزي : كومون توباندد سيبريم

Common two-banded sea bream

القَراقُوزْ الموَشّمْ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تتراوح بين 15 و 70 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر التمور (أكتوبر) – أيّ النار (يناير) .

الحجم : 15 – 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : المَنْكُوسْ

الإسم العلمي : ليثوقناثس مورميرس

Lithognathus mormyrus

الإسم الإنجليزي : ستريبد سيبريم

Striped sea bream

المَنْكُوسْ

المعيشة : أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 15 و 50 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 20 – 30 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : الكَحْلَةُ

الإسم العلمي : أوبلادا ميلانورا

Oblada melanura

الإسم الإنجليزي : سادلد بريم

Saddledbream

الكَحْلَةُ

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تصل إلى 30 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) – الصيف (يونيو) .

الحجم : 35 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : الحَمْرَايَةْ

الإسم العلمي : باجيلاّس بوجارافيو

Pagellus bogaraveo

الإسم الإنجليزي : ريد سيبريم

Red sea bream

الحَمْرَايَةُ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 400 متر .


الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر أيّ النار (يناير) – الماء (مايو) .

الحجم : 30 - 50 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE **عائلة : سباريدي**



الإسم المحلّي : التَّنُّوتْ

الإسم العلمي : سبونديليوسوما كانثارس

Spondyliosoma cantharus

الإسم الإنجليزي : بلاك سيبريم

Black sea bream

التَّنُّوت

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 50 متراً .

الغذاء : القشريات ، الطحالب الخضراء والأعشاب البحرية .


موسم التكاثر : **أشهر النوّار (فبراير) – الماء (مايو)** .

الحجم : 20 – 50 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : الشَّلْبَةُ

الإسم العلمي : ساربا سالبا

Sarpa salpa

الإسم الإنجليزي : ساليما

Salema

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

الشَّلْبَةُ

المعيشة : قاعية و شاطئية ، تعيش في مجموعات بالمناطق الصخرية (المغطاة بالطحالب) و المناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 5 و 70 متراً .

الغذاء : الأعشاب البحرية ، والطحالب الخضراء .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والخريف .

الحجم : 25 - 45 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية وشباك الجرف .

FAMILY : SPARIDAE

عائلة : سباريدي



الإسم المحلّي : الموزة (البوقة)

الإسم العلمي : بوبس بوبس

Boops boops

الإسم الإنجليزي : بوق

Bogue

الموزة (البوقة)

المعيشة : قاعية ، أو شبه عائمة ، تعيش في مجموعات بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 200 متر .

الغذاء : القشريات ، الأعشاب البحرية ، الأسفنج والطحالب الخضراء ،


موسم التكاثر : شهرا الطير (أبريل) و الماء (مايو) .

الحجم : 20 - 36 سم .

طرق الصيد : اللمبارة (شباك التحليق) وشباك الجرف .

FAMILY : SCORPAENIDAE

عائلة : سكوربينيدي



الإسم المحلّي : العقرب الأحمر (شكورفو)

الإسم العلمي : سكوربينا شكورفا

Scorpaena scorfa

الإسم الإنجليزي : ريد سكوربيون فيش

Red scorpionfish

العقرب الأحمر (شكورفو)

المعيشة : أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .


الغذاء : الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .

موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 20 - 50 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SCORPAENIDAE **عائلة : سكوربينيدي**



الإسم المحلّي : العَقْرَبُ الأسود (شكوروفو)

الإسم العلمي : سكوربينا بوركس

Scorpaena porcus

الإسم الإنجليزي : بلاك سكوربيون فيش

Black scorpionfish

العَقْرَبُ الأسود (شكورفو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالطحالب عند أعماق تصل إلى 800 متر .

الغذاء : الأسماك والقشريات .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 15 – 25 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SCORPAENIDAE

عائلة : سكوربينيدي



الإسم المحلّي : العَقْرَبْ الصَّخري (شكورفو)

الإسم العلمي : هليكولينس دكتيلوبترس

Helicolenus dactylopterus

الإسم الإنجليزي : روك فيش بلو ماوث

Rockfish-blue mouth

العَقْرَبْ الصَّخري (شكورفو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 200 و 1000 متر .

الغذاء : القشريات ، الأسماك والرخويات (السيبيا والأخطبوط) .

موسم التكاثر : شهرا النوّار (فبراير) و المريخ (مارس) .

الحجم : 20 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلّي : الدَّجَاجَةُ

الإسم العلمي : إيوتريجلا جورناردس

Eutrigla gurnardus

الإسم الإنجليزي : قري قورنارد

Grey gurnard

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

الدَّجَاجَةُ

المعيشة : قاعية تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تصل إلى 170 متراً .

الغذاء : القشريات ، القواقع ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلّي : الدَّجَاجَةُ

الإسم العلمي : تريقلا لوسيرنا

Trigla lucerna

الإسم الإنجليزي : تب قورنارد

Tub gurnard

الدَّجَاجَةُ

المعيشة : قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 300 متر .

الغذاء : القشريات ، القواقع ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) – ناصر (يوليو) .

الحجم : 20 – 75 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلّي : الدَّجَاجَةُ

الإسم العلمي : أسبتريقلا كيوكولس

Aspitrigla cuculus

الإسم الإنجليزي : ريد قورنارد

Red gurnard

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

الدَّجَاجَة

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 30 و 250 متراً .

الغذاء : القشريات ، القواقع ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر الطير (إبريل) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 25 - 50 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : TRIGLIDAE

عائلة : تريقليدي



الإسم المحلّي : الدَّجَاجَةُ

الإسم العلمي : تريقلوبورس لستوفيزا

Trigloporus lastoviza

الإسم الإنجليزي : استريكد قورنارد

Streaked gurnard

الدَّجَاجَةُ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 150 مترًا .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 – 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SCIAENIDAE

عائلة : سيانيدي



الإسم المحلّي : البَغْلَةُ

الإسم العلمي : أمبرينا سيرّوزا

Umbrina cirrosa

الإسم الإنجليزي : شي درم

Shi drum

البَغْلَةُ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : أحياء القاع (قشريات وقواقع بحرية) .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 40 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SCIAENIDAE

عائلة : سيانيدي



الإسم المحلّي : الغُرابُ

الإسم العلمي : سينا أومبرا

Sciaena umbra

الإسم الإنجليزي : براون ميقر

Brown meagre

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية - تاجوراء 1990 .

الغُرَابُ

المعيشة : أسماك تعيش بالمناطق الصخرية بالقرب من الشواطئ وعند أعماق تتراوح بين 20 و 130 متراً .

الغذاء : يرقات الأسماك والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر المريخ (مارس) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 10 – 50 سم .

طرق الصيد : الشباك الخيشومية و شباك الجرف .

FAMILY : LOPHIIDAE

عائلة : لوفييدي



الإسم المحلّي : أبُو شَصْ (جَرَانَة)

الإسم العلمي : لوفيوس بسكتورياس

Lophius piscatorius

الإسم الإنجليزي : أنقلرفيش

Anglerfish

أَبُو شَصْ (جَرَانَةُ)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تصل إلى 500 متر .

الغذاء : الأسماك ، القشريات ، وأحياناً الطيور البحرية .


موسم التكاثر : أشهر النوار (فبراير) - ناصر (يوليو) .

الحجم : 20 - 200 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : URANOSCOPIDAE

عائلة : يورانوسكوبيدى



الإسم المحلّي : البُومَةُ (بلُّمْ)

الإسم العلمي : يورانوسكوبس سكابر

Uranoscopus scaber

الإسم الإنجليزي : ستار قيزر

Stargazer

البُومَةُ (بُلُّمْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 15 و 100 متر .

الغذاء : الأسماك الصغيرة والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 – 35 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : POMATOMIDAE

عائلة : بوماتوميدي



الإسم المحلّي : المَيَّاسْ (سيـرَّا)

الإسم العلمي : بوماتوماس سالتيتر

Pomatomus saltator

الإسم الإنجليزي : بلوفيش

Bluefish

المَيَّاسْ (سيـرًا)

المعيشة : عائمة ومهاجرة ، تعيش في مجموعات بالمياه الدافئة عند أعماق تتراوح بين 5 و 200 متر .

الغذاء : القشريات والرخويات (السيبيا والأخطبوط) .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 40 - 110 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : TRACHINIDAE

عائلة : تراكيندي



الإسم المحلّي : التَّراخِين المنقَّط (تراجْنَا)

الإسم العلمي : تراكينس أرانيوس

Trachinus araneus

الإسم الإنجليزي : سبوتيد ويفر

Spotted weaver

التَّراخِين المنقَّط (تَراجْنَا)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة ، عند أعماق تصل إلى 150 متراً .

الغذاء : الأسماك الصغيرة والقشريات .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 25 – 30 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سـرّانيدي



الإسم المحلّي : الفَرُّوجْ (دُوتْ)

الإسم العلمي : إيبينفلاس قوزا

Epinephelus guaza

الإسم الإنجليزي : دسكي قروبر

Dusky grouper

الفَرُّوجْ (دُوتْ)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية عند أعماق تتراوح بين 8 و 200 متر .

الغذاء : الرخويات (السيبيا والأخطبوط) والقشريات والأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 – 160 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الخيط بالصنار والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سرّانيدي



الإسم المحلّي : المَنَّانِي (فَرُّوج أكْحَل)

الإسم العلمي : بوليبريون أمريكانس

Polyprion americanus

الإسم الإنجليزي : ريك فيش

Wreckfish

المَنَّانِي (فَرُّوج أكْحَل)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 40 و 1000 متر .

الغذاء : القشريات ، القواقع ، ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 30 – 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سرَّانيدي



الإسم المحلّي : المَنَّانِي

الإسم العلمي : إيبينفلاس إنياس
Epinephelus aeneus
الإسم الإنجليزي : وايت قروبر
White grouper

منشور بـ مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990.

المَنَّانِي

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 20 و 200 متر .

الغذاء : الرخويات (السيبيا والأخطبوط) ، القشريات والأسماك .


موسم التكاثر : فصل الربيع ؛ أشهر المريخ (مارس) – الماء (مايو) .

الحجم : 20 – 120 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الخيط بالصنار والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سَّرانيدي



الإسم المحلّي : السَّـــرَّانُ

الإسم العلمي : سِرّانس كبريلاّ

Serranus cabrilla

الإسم الإنجليزي : كومبر

Comber

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

السّـــرّان

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 500 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الطير (إبريل) - ناصر (يوليو) .

الحجم : 20 - 45 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : SERRANIDAE

عائلة : سرَّانيدي



الإسم المحلّي : البَراكِشْ (القَبْرُون)

الإسم العلمي : سِرّانس سكريبا

Serranus scriba

الإسم الإنجليزي : بينتد كومبر

Painted comber

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

البَراكِشْ (القَنْبَرُون)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية عند أعماق تصل إلى 150 متراً .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 – 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : LABRIDAE

عائلة : لابْريدي



الإسم المحلّي : الخضِّيرْ (أبو خضّير)

الإسم العلمي : لابراس برجيلاتا

Labrus bergylata

الإسم الإنجليزي : بلاَّن راسّ

Ballan wrasse

الخضِّير (أبو خضيِّر)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالأعشاب والطحالب البحرية القريبة من الشواطئ عند أعماق تتراوح بين 1 و 20 مترًا .

الغذاء : القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : أشهر المريخ (مارس) – الماء (مايو) و فصل الصيف .

الحجم : 30 – 50 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والشباك الخيشومية .

FAMILY: LABRIDAE

عائلة : لابْريدي



الإسم المحلّي : العرَيِّسةُ

الإسم العلمي : كوريس جوليس

Coris julis

الإسم الإنجليزي : رينبو راس

Rainbow wrasse

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية بالجوراء، 1990 م

العَرَيِّسَةُ

المعيشة : قاعية ،تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالأعشاب البحرية القريبة من الشواطئ عند أعماق تتراوح بين 1 و 60 متراً .


الغذاء : القشريات ، القواقع والديدان البحرية .

موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 15 - 25 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY : CENTRACANTHIDAE　　　　**عائلة** : سينتراكانثدي



الإسم المحلّي : أبُو زَمَّارة (زِميمْرَة)

الإسم العلمي : سبيكارا سمارس

Spicara smaris

الإسم الإنجليزي : بيكاريل

Picarel

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

أبو زَمَّارَةْ (زِميمْرَة)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية (المغطاة بالأعشاب البحرية) والوحلة ، عند أعماق تتراوح بين 15 و 100 متر .

الغذاء : القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : شهر النوّار (فبراير) – الماء (مايو) .

الحجم : 15 – 20 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : CENTRACANTHIDAE

عائلة : سينتراكانثدي



الإسم المحلّي : الزُّرِّيقَةْ

الإسم العلمي : سبيكارا مينا

Spicara maena

الإسم الإنجليزي : بلوتشيد بيكاريل

Blotched picarel

الزُّرِّيقَةْ

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية (المغطاة بالأعشاب البحرية) والوحلة عند أعماق تصل إلى 100 متر .

الغذاء : القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : أشهر هانيبال (أغسطس) ـ التمور (أكتوبر) .

الحجم : 20 - 25 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : BRAMIDAE

عائلة : براميدي



الإسم المحلّي : الكَسْتَنَائيَّة (قَصْطلَة)

الإسم العلمي : براما براما

Brama brama

الإسم الإنجليزي : أطلنطيك بومفريت

Atlantic pomfret

الكَسْتَنَانيةُ (قَصْطَلَة)

المعيشة : عائمة بالمياه الدافئة عند أعماق تتراوح بين 20 و 100 متر .

الغذاء : الأسماك الصغيرة ، والرخويات (السيبيا والأخطبوط) .


موسم التكاثر : شهرا هانيبال (أغسطس) و الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 40 - 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والشباك الخيشومية .

FAMILY: LUVARIDAE

عائلة : لوفاريدي



الإسم المحلّي : الكُوَّة (الامبراطور)

الإسم العلمي : لوڤارس إمبرياليس

Luvarus imperialis

الإسم الإنجليزي : لوڤار

Luvar

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية، تاجوراء، 1990 م

الكُوَّةْ (الامبراطور)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمياه العميقة ، عند أعماق تصل إلى 200 متر .

الغذاء : القشريات والهوائم الحيوانية والنباتية .


موسم التكاثر : **فصلا** الربيع و الصيف .

الحجم : 60 -152 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

الإسم العلمي : سولياڤولقارس

Solea vulgaris

الإسم الإنجليزي : كومون صول

Common sole

سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 200 متر .

الغذاء : القواقع الصغيرة ، الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر أيّ النار (يناير) – الطير (أبريل) .

الحجم : 25 – 70 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مَدَاسْ)

الإسم العلمي : سوليا لاسكارس

Solea lascaris

الإسم الإنجليزي : ساند صول

Sand sole

سَمَكْ مُوسَى (مَدَاسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة ، عند أعماق تتراوح بين 5 و 350 مترًا .

الغذاء : القواقع الصغيرة ، الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) - الفاتح (سبتمبر) .

الحجم : 15 - 140 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلّي : سمك موسى (مداس)

الإسم العلمي : ميكروكيرس ڤاريقاتس

Microchirus variegatus

الإسم الإنجليزي : ثيكباك صول

Thickback sole

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

سمك موسى (مداس)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 80 و 400 متر .

الغذاء : القواقع الصغيرة ، الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : فصلا الربيع والصيف .

الحجم : 12 - 20 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SOLEIDAE

عائلة : سوليدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

الإسم العلمي : ديكولوقوقلوسا كُنياتا

Dicologoglossa cuneate

الإسم الإنجليزي : ويدج صول

Wedge sole

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

سَمَكْ مُوسَى (مَدَاسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمياه الدافئة في المناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 10 و 100 متر .

الغذاء : القواقع الصغيرة و الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : أوائل الخريف و فصل الشتاء .

الحجم : 7 - 20 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : BOTHIDAE

عائلة : بوثيدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

الإسم العلمي : أرنوقلوسوس كيسّلري

Arnoglossus kessleri

الإسم الإنجليزي :

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة ، عند أعماق تتراوح بين 5 و 300 متر .

الغذاء : القواقع الصغيرة و الديدان البحرية والقشريات .


موسم التكاثر : أشهر الماء (مايو) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 8 – 45 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : BOTHIDAE

عائلة : بوثيدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

الإسم العلمي : أرنوقلوسوس لاتيرنا

Arnoglossus laterna

الإسم الإنجليزي : سكالد فيش

Scaldfish

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية . تاجوراء. 1990 م

سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 200 متر .


الغذاء : اللافقاريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الطير (أبريل) – هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 5 – 20 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SCOPHTHALMIDAE **عائلة** : سكوفثلميدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

الإسم العلمي : لبيدورهمبس بوسكي

Lepidorhombus boscii

الإسم الإنجليزي : فورسبوتيد ميقريم

Four-spotted megrim

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

سَمَكْ مُوسَى (مَداسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والوحلة عند أعماق تصل إلى 700 متر .


الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر المريخ (مارس) - الصيف (يونيو) .

الحجم : 10 - 40 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SCOPHTHALMIDAE **عائلة** : سكوفثلميدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى (مدَاسْ)

الإسم العلمي : لبيدورهمبس ويفّياقونس

Lepidorhombus whiffiagonis

الإسم الإنجليزي : ميقريم

Megrim

منشورات مركز بحوث الاحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

سَمَكْ مُوسَى (مدَاسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 400 متر .

الغذاء : القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : **أشهر** المرّيخ (مارس) – الصيف (يونيو) .

الحجم : 20 – 60 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY : SCOPHTHALMIDAE

عائلة : سكوفثلميدي



الإسم المحلّي : سَمَكْ مُوسَى / تَرْبُوتْ (مداَسْ)

الإسم العلمي : بسيتّا ماكسيما

Psetta maxima

الإسم الإنجليزي : تربوت

Turbot

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

سَمَكْ مُوسَى / تَرْبُوتْ (مدَاسْ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 70 متراً .

الغذاء : القشريات و القواقع البحرية ويرقات الأسماك .

موسم التكاثر : أشهر الطير (إبريل) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 40 - 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف .

FAMILY: MURAENIDAE

عائلة : مورانيدي



الإسم المحلّي : ثعْبَانُ البَحْر (زمْرينةَ)

الإسم العلمي : مورينا هيلينا

Muraena helena

الإسم الإنجليزي : ميدترّانيان موري

Mediterranean moray

ثعبَانُ البَحْر (زمْرينةَ)

المعيشة : قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية المغطاة بالطحالب والأعشاب البحرية القريبة من الشواطئ والسواحل .

الغذاء : الرخويات (السيبيا والأخطبوط) والأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) ـ هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 130 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية ، الخيط بالصنار ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : ANGULLIDAE

عائلة : أنقولّيدي



الإسم المحلّي : ثُعْبَانُ المَاءْ (أنْقويلاً)

الإسم العلمي : أنقويلاّ أنقويلاّ

Anguilla anguilla

الإسم الإنجليزي : إيل

Eel

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء 1990 م

ثُعْبَانُ المَاءْ (أنْقَويلاً)

المعيشة : أسماك قاعية ، مهاجرة ؛ و تعيش بالمياه العذبة والضحلة (البحيرات) .

الغذاء : الهوائم الحيوانية ، القشريات ويرقات الأسماك .


موسم التكاثر : فصلا الشتاء والربيع .

الحجم : 30 - 100 سم .

طرق الصيد : الخيط الطويل (البرنقالي) ، الشباك الخيشومية ، وشباك الجرف .

FAMILY : CONGRIDAE

عائلة : كونقريدي



الإسم المحلّي : الجُرَيِّثْ (قرَنْقُو)

الإسم العلمي : كونقر كونقر

Conger conger

الإسم الإنجليزي : أوربّيان كونقر

European conger

الجُرَيِّثْ (قرَنْقُو)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الصخرية والرملية ، عند أعماق تتراوح بين 5 و 155 متراً .

الغذاء : الرخويات (السيبيا والأخطبوط)، القشريات والأسماك .


موسم التكاثر : فصل الصيف ؛ أشهر الصيف (يونيو) - هانيبال (أغسطس) .

الحجم : 20 - 300 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، الشباك الخيشومية . الخيط بالصنار ، والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : TRIAKIDAE

عائلة : ترياكيدي



الإسم المحلّي : القِرْش الثُّوبْ (كلب البحر)

الإسم العلمي : قاليورهينس قاليوس

Galeorhinus galeus

الإسم الإنجليزي : توب شارك

Tope shark

القِرْش الثُّوبْ (كلب البحر)

المعيشة : أسماك عائمة بالمياه العليا القريبة من الشواطئ .

الغذاء : الأسماك و الرخويات (السيبيا و الأخطبوط) .


موسم التكاثر : فصلا الشتاء والربيع .

الحجم : 50 - 200 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، و الخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SQUALIDAE

عائلة : سكواليدي



الإسم المحلّي : القِرْشْ المِهْمَازي (كلب البحر)

الإسم العلمي : سكوالس أكانثياس

Squalus acanthias

الإسم الإنجليزي : سبيردوق

Spurdog

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية - تاجوراء 1990 م

القِرْشُ المِهْمَازي (كلب البحر)

المعيشة : أسماك قاعية مهاجرة وعائمة ، تعيش عند أعماق تتراوح بين 10 و 200 متر .

الغذاء : اللافقاريات ، (الرخويات) ، والأسماك .


موسم التكاثر : فصلا الشتاء والربيع .

الحجم : 75 - 300 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : LAMNIDAE

عائلة : لامنيدي



الإسم المحلّي : القِرْشْ قصيرُ الزَّعْنَفَة / ماكُو (كلب البحر)

الإسم العلمي : أزيورس أوكسيرنكاس

Isurus oxyrinchus

الإسم الإنجليزي : شورتفين ماكو

Shortfin mako

القِرْشْ قصيرُ الزَّعْنَفَة / ماكُو (كلب البحر)

المعيشة : أسماك عائمة وقاعية ، تعيش عند أعماق تصل إلى 400 متر .

الغذاء : الأسماك العائمة (السردين ، الأنشوقة) والرخويات (السيبيا والاخطبوط) .

موسم التكاثر :

الحجم : 3 - 4 أمتار .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SCYLIORHINIDAE

عائلة : سكيليورهيندي



الإسم المحلّي : القِرْشْ دَقيقُ التَّرْقيط (كلب البحر)

الإسم العلمي : سكيليورهينس كانيكيولا

Scyliorhinus canicula

الإسم الإنجليزي : سمولسبوتد كاتشارك

Smallspotted catshark

منشورات مركز بحوث الأحياء البحرية تاجوراء، 1990 م

القِرْشْ دَقيقُ التَّرْقيط (كلب البحر)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 400 متر .

الغذاء : الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : أشهر الحرث (نوفمبر) ـ ناصر (يوليو) .

الحجم : 20 – 100 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : SQUATHINIDAE

عائلة : سكواثينيدي



الإسم المحلّي : القِرْش الملاَكْ (السّفَنْ)

الإسم العلمي : سكواتينا سكواتينا

Squatina squatina

الإسم الإنجليزي : إينجل شارك

Angelshark

القرِْش الملاَكْ (السّفَنْ)

المعيشة : أسماك قاعية ، تعيش بالمناطق الرملية والوحلة عند أعماق تتراوح بين 5 و 100 متر .

الغذاء : الأسماك ، القشريات والقواقع البحرية .


موسم التكاثر : أشهر الكانون (ديسمبر) – النوّار (فبراير) .

الحجم : 50 – 250 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف والخيط الطويل (البرنقالي) .

FAMILY : RAJIDAE

عائلة : راجيدي



الإسم المحلّي : الرّايَةُ (شَائكةُ الظَّهْر)

الإسم العلمي : رايا كلاڤاتا

Raja clavata

الإسم الإنجليزي : ثورنباك راي

Thornback ray

الرَّايَةُ (شَائكةُ الظَّهْرِ)

المعيشة : أسماك قاعية تعيش بالمناطق الصخرية والرملية والوحلة عند أعماق تصل إلى 300 متر .

الغذاء : القشريات والكائنات البحرية الدقيقة .

موسم التكاثر : فصلا الشتاء والربيع .

الحجم : 20 - 90 سم .

طرق الصيد : شباك الجرف ، والشباك الخيشومية .